

Matemática Atuarial II

Aula 5

Danilo Machado Pires
danilo.pires@unifal-mg.edu.br

Créditos: Leonardo Henrique Costa; leonardo.costa@unifal-mg.edu.br

<https://www.portahalley.org/materiais.html#notas>

➤ Notas de aula da disciplina Matemática Atuarial I, oferecida pelo curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia/ ciências atuariais da Universidade Federal de Alfenas-Campos varginha.

PIRES,M.D. COSTA, L,H. Seguros de Vida, Status Vida Conjunta. [Notas de aula]. Universidade Federal de Alfenas, Curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia, Alfenas, 2026. Disponível em: <https://www.portahalley.org/materiais.html#notas>. Acesso em: 28 jun. 2026.


Status vida conjunta

- Um “status” pode ser entendido como a entidade à qual se associa a variável aleatória tempo de vida adicional.
 - Por exemplo, podemos dizer que estávamos estudando status composto por uma única vida.
 - Uma condição (estado).
- O **status de vida conjunta** é formado por duas ou mais vidas e permanece ativo enquanto todas estiverem vivas. Sua duração corresponde ao menor dos tempos de vida futuros. Quando as vidas são independentes, sua função de sobrevivência pode ser obtida pelo produto das sobrevivências individuais.

Status vida conjunta

O status composto por várias vidas (independentes), que “falha” com o primeiro sinistro é chamado de **Status vida conjunta**.

Analogia com um circuito em série




Status vida conjunta

O status composto por várias vidas, para o qual se estabelece a regra de que o status falha com a primeira morte, é o chamado **Status vida Conjunta**

Status vida conjunta

Ilustração do instante da primeira falha entre múltiplas vidas



Status vida conjunta

Considere o vetor aleatório $(T_{x_1}, T_{x_2}, T_{x_3}, \dots, T_{x_n})$ composto pelas variáveis aleatórias das sobrevidas de n pessoas, então a sobrevida resultante do *status vida conjunta* relacionado a esse vetor é dada por:

$$T_{x_{(1)}} = \min(T_{x_1}, T_{x_2}, T_{x_3}, \dots, T_{x_n})$$

$T_{x_{(1)}}$ representa o tempo até a primeira morte entre os indivíduos que compõem o status.

Status vida conjunta

Em particular, daremos mais atenção a seguros sobre duas vidas (x e y), assim:

$$T_{x,y} = \min(T_x, T_y)$$

Por definição $F_{T_{x,y}}(t)$ representa a probabilidade de que aquele que viver menos entre x e y não sobreviva até o instante t , ou seja:

$$F_{T_{x,y}}(t) = P(T_{x,y} \leq t) = P(\min(T_x, T_y) \leq t) = {}_t q_{x,y}$$

*A notação $T_{x,y}$ representa o tempo de vida futuro do status vida conjunta, assim $T_{x,y} = T_{(1)}$

Status vida conjunta- Sob a hipótese de independência

$$F_{T_{x,y}}(t) = P(T_{x,y} \leq t) = P(\min\{T_x, T_y\} \leq t) = {}_t q_{x,y}$$

	y – vivo	y – morto	
x –vivo	${}_t p_x \quad {}_t p_y$	${}_t p_x \quad {}_t q_y$	${}_t p_x$
x –morto	${}_t q_x \quad {}_t p_y$	${}_t q_x \quad {}_t q_y$	${}_t q_x$
	${}_t p_y$	${}_t q_y$	1

Se o mínimo entre T_x e T_y é menor que t , então:

$${}_t q_{x,y} = P(T_x \leq t \text{ ou } T_y \leq t) = ({}_t q_x \quad {}_t p_y + {}_t q_x \quad {}_t q_y + {}_t p_x \quad {}_t q_y)$$

$${}_t q_{x,y} = P(T_x \leq t \text{ ou } T_y \leq t) = ({}_t q_x \quad {}_t p_y + {}_t q_x \quad {}_t q_y + {}_t p_x \quad {}_t q_y + {}_t q_x \quad {}_t q_y) - {}_t q_x \quad {}_t q_y$$

$${}_t q_{x,y} = {}_t q_x + {}_t q_y - {}_t q_x \quad {}_t q_y$$

Probabilidade de a falha do status ocorrer em um período menor ou igual a t .

Status vida conjunta- Sob a hipótese de independência

$$S_{T_{x,y}}(t) = P(T_{x,y} > t) = P(\min\{T_x, T_y\} > t) = {}_t p_{x,y}$$

$${}_t p_{x,y} = P(T_{x,y} > t) = P(T_x > t \text{ e } T_y > t)$$

$${}_t p_{x,y} = P(T_x > t \text{ e } T_y > t) = {}_t p_x {}_t p_y$$

O status em questão sobrevive por t anos $\Leftrightarrow (x)$ e (y) também sobrevivem.

$$S_{T_{x,y}}(t) = {}_t p_x {}_t p_y = {}_t p_{x,y}$$

Probabilidade da sobrevivência do status ao período t .

Resumo

Seja $T_{x,y} = \min(T_x, T_y)$ então:

$$F_{T_{x,y}}(t) = {}_t q_x + {}_t q_y - {}_t q_x {}_t q_y = {}_t q_{x,y}$$

$$S_{T_{x,y}}(t) = {}_t p_x {}_t p_y = {}_t p_{x,y}$$

$${}_t q_{x,y} = 1 - {}_t p_{x,y}$$

EXEMPLO 1: Sejam T_{45} e T_{50} os tempos de vida futuros independentes, obtenha as expressões pedidas (utilizando a notação utilizada para o status x, y):

- a) A probabilidade de que a primeira morte ocorra entre 5 e 10 anos.
- b) A probabilidade de que ambos vivam pelo menos mais 10 anos.
- c) A probabilidade de que ao menos um esteja morto ao fim de 30 anos.

EXEMPLO 1:

a) A probabilidade de que a primeira morte ocorra entre 5 e 10 anos.

$$P(5 < T_{45,50} \leq 10) = P(T_{45,50} > 5) - P(T_{45,50} > 10)$$

$$P(5 < T_{45,50} \leq 10) = {}_5p_{45,50} - {}_{10}p_{45,50}$$

$$P(5 < T_{45,50} \leq 10) = ({}_5p_{45})({}_5p_{50}) - ({}_{10}p_{45})({}_{10}p_{50})$$

b) A probabilidade de que ambos vivam pelo menos mais 10 anos.

$$S_{T_{45,50}}(10) = P(T_{45,50} > 10)$$

$${}_{10}p_{45,50} = ({}_{10}p_{45})({}_{10}p_{50})$$

EXEMPLO 1:

c) A probabilidade de que ao menos um esteja morto ao fim de 30 anos.

$$F_{T_{45,50}}(30) = P(T_{45} \leq 30 \text{ ou } T_{50} \leq 30) = {}_{30}q_{45,50}$$

$${}_{30}q_{45,50} = {}_{30}q_{45} + {}_{30}q_{50} - {}_{30}q_{45} {}_{30}q_{50}$$

Ou

$${}_{30}q_{45,50} = 1 - {}_{30}p_{45} \times {}_{30}p_{50}$$

Status vida conjunta

A probabilidade de que o número de **anos completos vividos** pelo status seja t é dada por ${}_t|q_{x,y}$:

$${}_t|q_{x,y} = P(T_{x,y} = t)$$

$${}_t|q_{x,y} = P(t < T_{x,y} \leq t + 1) = P(T_{x,y} > t) - P(T_{x,y} > t + 1)$$

$${}_t|q_{x,y} = {}_t p_{x,y} - {}_{t+1} p_{x,y} = {}_t p_{x,y} - {}_t p_{x,y} (p_{x+t,y+t})$$

$${}_t|q_{x,y} = {}_t p_{x,y} (1 - p_{x+t,y+t})$$

$${}_t|q_{x,y} = ({}_t p_{x,y}) (q_{x+t,y+t})$$

Status vida conjunta

A probabilidade de que o número de anos completados pelo status seja t é dada por ${}_t|q_{x,y}$:

$${}_t|q_{x,y} = ({}_tp_{x,y}) (q_{x+t,y+t})$$

$${}_t|q_{x,y} = ({}_tp_x)({}_tp_y)(q_{x+t} + q_{y+t} - q_{x+t} q_{y+t})$$

$${}_t|q_{x,y} = ({}_tp_x)({}_tp_y)(1 - p_{x+t} p_{y+t})$$

EXEMPLO 2: Considere o trecho da tabela de mortalidade (AT-49).

Idade	q_x	p_x	l_x
104	0,60271	0,39729	114,992
105	0,63896	0,36104	45,6853
106	0,67514	0,32486	16,4942
107	0,71090	0,28910	5,35831
108	0,74582	0,25418	1,54909
109	1	0,00000	0,39375

Calcule ${}_1|q_{104,107}$ e ${}_2|q_{104,107}$

Calcule ${}_1|q_{104,107}$ e ${}_2|q_{104,107}$

$${}_1|q_{104,107} = (p_{104})(p_{107})(q_{105} + q_{108} - q_{105} q_{108})$$

$${}_2|q_{104,107} = ({}_2p_{104})({}_2p_{107})(q_{106} + q_{109} - q_{106} q_{109})$$

Status vida conjunta

A probabilidade de que o status sobreviva a t anos e falhe antes de $t + u$ anos é dada por ${}_t|uq_{x,y}$:

$${}_t|uq_{x,y} = P(t < T_{x,y} \leq t + u)$$

$${}_t|uq_{x,y} = P(T_{x,y} > t) - P(T_{x,y} > t + u)$$

$${}_t|uq_{x,y} = {}_t p_{x,y} - {}_{t+u} p_{x,y} = {}_t p_{x,y} - {}_t p_{x,y} ({}_u p_{x+t,y+t})$$

$${}_t|uq_{x,y} = {}_t p_{x,y} (1 - {}_u p_{x+t,y+t})$$

$${}_t|uq_{x,y} = ({}_t p_{x,y}) ({}_u q_{x+t,y+t})$$

Status vida conjunta

A probabilidade de que o status sobreviva a t anos e falhe antes de $t + u$ anos é dada por ${}_{t|u}q_{x,y}$:

$${}_{t|u}q_{x,y} = ({}_tp_{x,y})({}_uq_{x+t,y+t})$$

$${}_{t|u}q_{x,y} = ({}_tp_x)({}_tp_y)({}_uq_{x+t} + {}_uq_{y+t} - {}_uq_{x+t} \times {}_uq_{y+t})$$

$${}_{t|u}q_{x,y} = ({}_tp_x)({}_tp_y)(1 - {}_up_{x+t} \times {}_up_{y+t})$$

EXEMPLO 3: Seja o tempo de vida futuro T_{45} e T_{50} independentes, então obtenha a probabilidade de que a primeira morte ocorra entre 5 e 10 anos.

$$P(5 < T_{45,50} \leq 10) = {}_5p_{45,50} - {}_{10}p_{45,50}$$

$$P(5 < T_{45,50} \leq 10) = ({}_5p_{45})({}_5p_{50}) - ({}_{10}p_{45})({}_{10}p_{50})$$



EXEMPLO 3: Seja o tempo de vida futuro T_{45} e T_{50} independentes, então obtenha a probabilidade de que a primeira morte ocorra entre 5 e 10 anos.

$$P(5 < T_{45,50} \leq 10) = {}_5p_{45,50} - {}_{10}p_{45,50}$$


$$P(5 < T_{45,50} \leq 10) = ({}_5p_{45})({}_5p_{50}) - ({}_{10}p_{45})({}_{10}p_{50})$$

$${}_5|_5q_{45,50} = ({}_5p_{45})({}_5p_{50})(1 - {}_5p_{50} \times {}_5p_{55})$$

$${}_5|_5q_{45,50} = ({}_5p_{45})({}_5p_{50}) - ({}_5p_{45})({}_5p_{50})({}_5p_{50} \times {}_5p_{55})$$

$${}_5|_5q_{45,50} = ({}_5p_{45})({}_5p_{50}) - ({}_{10}p_{45})({}_{10}p_{50})$$

- **Portal Halley** : <https://atuaria.github.io/portalhalley/>
- Bowers et al. **Actuarial Mathematics**, 2ª edição. SOA, 1997.
- D. C. M. Dickson, M. R. Hardy and H. R. Waters. **Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks**. Cambridge University Press, 2019.
- CORDEIRO FILHO, Antônio. **Cálculo Atuarial Aplicado: teoria e aplicações, exercícios resolvidos e propostos**. São Paulo: Atlas, 2009.
- FERREIRA, P. P. **Matemática Atuarial: Riscos de Pessoas**. Rio de Janeiro: ENS, 2019.
- PIRES, M.D.; COSTA, L.H.; FERREIRA, L.; MARQUES, R. **Fundamentos da matemática atuarial: vida e pensões**. Curitiba :CRV, 2022.



Matemática Atuarial II

Aula 6

Danilo Machado Pires
danilo.pires@unifal-mg.edu.br

Créditos: Leonardo Henrique Costa; leonardo.costa@unifal-mg.edu.br

<https://www.portahalley.org/materiais.html#notas>

Resumo

Seja $T_{x,y} = \min(T_x, T_y)$ então:

$$F_{T_{x,y}}(t) = {}_t q_x + {}_t q_y - {}_t q_x {}_t q_y = {}_t q_{x,y}$$

$$S_{T_{x,y}}(t) = {}_t p_x {}_t p_y = {}_t p_{x,y}$$

$${}_t q_{x,y} = 1 - {}_t p_{x,y}$$

$${}_t | q_{x,y} = ({}_t p_{x,y}) (q_{x+t,y+t})$$

$${}_t | u q_{x,y} = ({}_t p_{x,y}) ({}_u q_{x+t,y+t})$$

Status vida conjunta (Seguro Vitalício)

- O valor presente atuarial de um seguro de vida vitalício com efeito imediato, e benefício pago **ao final do ano** de falha do *status vida conjunta*, com sobrevida caracterizada pela variável aleatória $T_{x,y}$, é dado por:

$$A_{x,y} = \sum_{t=0}^{\infty} v^{t+1} {}_t|q_{x,y}$$

Status vida conjunta (Seguros)

$$A_{x,y} = \sum_{t=0}^{\infty} v^{t+1} {}_t|q_{x,y} = \sum_{t=0}^{\infty} v^{t+1} ({}_tp_{x,y})(q_{x+t,y+t})$$

Consequentemente,

$$A_{x,y} = \sum_{t=0}^{\infty} v^{t+1} ({}_tp_x)({}_tp_y)(1 - p_{x+t} p_{y+t})$$

Ou

$$A_{x,y} = \sum_{t=0}^{\infty} v^{t+1} ({}_tp_x)({}_tp_y)(q_{x+t} + q_{y+t} - q_{x+t} q_{y+t})$$

EXEMPLO 1: Considere o trecho da tabela de mortalidade (AT-49).

Idade	q_x	p_x	l_x
104	0,60271	0,39729	114,992
105	0,63896	0,36104	45,6853
106	0,67514	0,32486	16,4942
107	0,71090	0,28910	5,35831
108	0,74582	0,25418	1,54909
109	1	0,00000	0,39375

A seguradora irá pagar um benefício de 1 *u.m.* (ao fim do ano de morte) caso pelo menos um dos segurados ($x = 104$ e $y = 107$ anos). Utilize $i = 5\%$.

$$A_{104,107} = v^1 P(T_{104,107} = 0) + v^2 P(T_{104,107} = 1) + v^3 P(T_{104,107} = 2) + \dots$$

$$A_{104,107} = v^1 {}_0|q_{104,107} + v^2 {}_1|q_{104,107} + v^3 {}_2|q_{104,107} + \dots$$

$$A_{104,107} = v^1 {}_0p_{104,107}q_{104,107} + v^2 {}_1p_{104,107}q_{105,108} + v^3 {}_2p_{104,107}q_{106,109} + \dots$$

$$A_{104,107} = \sum_{t=0}^{\infty} v^{t+1} {}_tp_{104,107}q_{104+t,107+t}$$

A duração máxima do status no seguro vitalício embora esteja representada por " ∞ ", corresponde a $\omega - \max(x, y)$, caso T_x e T_y pertençam à mesma tábua.

$$A_{104,107} = \sum_{t=0}^{\infty} v^{t+1} {}_tq_{104,107}$$

$$A_{104,107} = \sum_{t=0}^{\infty} v^{t+1} ({}_tp_{104})({}_tp_{107})(1 - p_{104+t} p_{107+t})$$

Ou

$$A_{104,107} = \sum_{t=0}^{\infty} v^{t+1} ({}_tp_{104})({}_tp_{107})(q_{104+t} + q_{107+t} - q_{104+t} q_{107+t})$$

?????

EXEMPLO 2: A seguradora irá pagar um benefício de 1 u.m. por um seguro vitalício, caso pelo menos um dos segurados faleça (T_{112} e T_{114}). Considere uma taxa de juros de 4% ao ano e tábua AT-2000 unisex. Calcule o prêmio puro único:

	x	q_x	p_x
106	105	0.37240	0.62760
107	106	0.40821	0.59179
108	107	0.44882	0.55118
109	108	0.49468	0.50532
110	109	0.54623	0.45377
111	110	0.60392	0.39608
112	111	0.66819	0.33181
113	112	0.73948	0.26052
114	113	0.81825	0.18175
115	114	0.90495	0.09505
116	115	1.00000	0.00000

$$A_{112,114} = \sum_{t=0}^{\infty} v^{t+1} {}_t p_{112,114} q_{112+t,114+t}$$

$$A_{112,114} = \sum_{t=0}^{\infty} v^{t+1} ({}_t p_{112} {}_t p_{114}) (1 - p_{112+t} p_{114+t})$$

$$A_{112,114} = \sum_{t=0}^{\infty} v^{t+1} {}_t p_{112} {}_t p_{114} (q_{112+t} + q_{114+t} - q_{112+t} q_{114+t})$$

????

Status vida conjunta (Seguro Temporário)

Caso o seguro contratado pelo status tenha período de cobertura definido, então temos um seguro temporário, tal que

$$A_{u^1:\overline{n}|} = \sum_{t=0}^{n-1} v^{t+1} P(T = t) = \sum_{t=0}^{n-1} v^{t+1} {}_t|q_{x,y} = \sum_{t=0}^{n-1} v^{t+1} ({}_tp_{x,y}) (q_{x+t,y+t})$$

$$A_{u^1:\overline{n}|} = \sum_{t=0}^{n-1} v^{t+1} {}_tp_x {}_tp_y (1 - p_{x+t}p_{y+t}) = \sum_{t=0}^{n-1} v^{t+1} {}_tp_x {}_tp_y (q_{x+t} + q_{y+t} - q_{x+t}q_{y+t})$$

em que $u = \{x, y\}$.

EXEMPLO 3: Calcule $A_{u^{1:\overline{5}}|}$, com $u = (x = 37, y = 1)$. Considere $i = 5\%$ ao ano e que T_{37} e T_1 possam ser modelados pela tábua de vida AT-49 masculina.

$$A_{u^{1:\overline{5}}|} = \sum_{t=0}^4 v^{t+1} ({}_t p_{37,1}) q_{37+t,1+t}$$

$$A_{u^{1:\overline{5}}|} = v q_{37,1} + v^2 ({}_1 p_{37,1}) q_{38,2} + v^3 ({}_2 p_{37,1}) q_{39,3} + v^4 ({}_3 p_{37,1}) q_{40,4} + v^5 ({}_4 p_{37,1}) q_{41,5}$$

EXEMPLO 3: Calcule $A_{u^1:\bar{5}|}$, com $u = (x = 37, y = 1)$. Considere $i = 5\%$ ao ano e que T_{37} e T_1 possam ser modelados pela tábua de vida AT-49 masculina.

$$A_{u^1:\bar{5}|} = \sum_{t=0}^4 v^{t+1} ({}_t p_{37,1}) q_{37+t,1+t}$$

$$A_{u^1:\bar{5}|} = v q_{37,1} + v^2 ({}_1 p_{37,1}) q_{38,2} + v^3 ({}_2 p_{37,1}) q_{39,3} + v^4 ({}_3 p_{37,1}) q_{40,4} + v^5 ({}_4 p_{37,1}) q_{41,5}$$

...

$$v^3 ({}_2 p_{37,1}) q_{39,3} = \left(\frac{1}{1 + 0,05} \right)^3 ({}_2 p_{37}) ({}_2 p_1) (1 - p_{39} p_3)$$

$$v^3 ({}_2 p_{37,1}) q_{39,3} = \left(\frac{1}{1 + 0,05} \right)^3 ({}_2 p_{37}) ({}_2 p_1) (q_{39} + q_3 - q_{39} q_3)$$

...

$$A_{u^1:\bar{5}|} \approx 0,01195$$

Status vida conjunta (Seguro vitalício)

$$A_{x,y} = \sum_{t=0}^{\infty} v^{t+1} ({}_t p_x) ({}_t p_y) (1 - p_{x+t} p_{y+t})$$

$$A_{x,y} = \sum_{t=0}^{\infty} v^{t+1} ({}_t p_x) ({}_t p_y) (q_{x+t} + q_{y+t} - q_{x+t} q_{y+t})$$

Status vida conjunta (Seguro temporário)

$$A_{u^1:\overline{n}|} = \sum_{t=0}^{n-1} v^{t+1} P(T = t) = \sum_{t=0}^{n-1} v^{t+1} {}_t|q_{x,y} = \sum_{t=0}^{n-1} v^{t+1} ({}_t p_{x,y}) (q_{x+t,y+t})$$

$$A_{u^1:\overline{n}|} = \sum_{t=0}^{n-1} v^{t+1} {}_t p_x {}_t p_y (1 - p_{x+t} p_{y+t}) = \sum_{t=0}^{n-1} v^{t+1} {}_t p_x {}_t p_y (q_{x+t} + q_{y+t} - q_{x+t} q_{y+t})$$

em que $u = \{x, y\}$.

Status vida conjunta (Seguro vitalício)

$$\text{var}(Z_{x,y}) = {}^2A_{x,y} - (A_{x,y})^2$$

$${}^2A_{x,y} = \sum_{t=0}^{\omega} v^{2t+2} {}_t|q_{x,y}$$

Status vida conjunta (Seguro temporário)

$$\text{var}(Z_{x,y}) = {}^2A_{u^1:\overline{n}|} - (A_{u^1:\overline{n}|})^2$$

$${}^2A_{u^1:\overline{n}|} = \sum_{t=0}^{n-1} v^{2t+2} {}_t|q_{x,y}$$

em que $u = \{x, y\}$.

Status vida conjunta (Seguro dotal puro)

O dotal puro aplicado ao status vida conjunta se caracteriza por pagar o benefício somente se todos os indivíduos do status sobreviverem ao período contratado. Sendo assim, para o status formado por x e y , temos:

$$Z_{t_u} = \begin{cases} v^n & T_u > n \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

$$A_{u:\bar{n}|^1} = v^n {}_np_{x,y} = v^n {}_np_x {}_np_y$$

em que $u = \{x, y\}$.

EXEMPLO 4: Um casal deseja contratar um seguro que irá pagar \$100000,00 caso ambos estejam vivos ao final de 6 anos. Qual o valor do prêmio puro único? Considere $x = 20$, $y = 25$ e $i = 5\%$ ao ano e que não serão acrescidos ao prêmio valores adicionais ao que se espera gastar com sinistros.

x	qx	px	lx
20	0,00062	0,99938	984341,5
21	0,00065	0,99935	983731,2
22	0,00067	0,99933	983091,8
23	0,00070	0,99930	982433,1
24	0,00073	0,99927	981745,4
25	0,00077	0,99923	981028,7
26	0,00081	0,99919	980273,3
27	0,00085	0,99915	979479,3
28	0,00090	0,99910	978646,8
29	0,00095	0,99905	977766
30	0,00100	0,99900	976837,1
31	0,00107	0,99893	975860,3
32	0,00114	0,99886	974816,1

$$Z_{t_u} = \begin{cases} 10^5 v^6 & T_u > 6 \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Em que $u = \{20, 25\}$

EXEMPLO 4: Um casal deseja contratar um seguro que irá pagar \$100000,00 caso ambos estejam vivos ao final de 6 anos. Qual o valor do prêmio pago por eles? Considere $x = 20$, $y = 25$ e $i = 5\%$ ao ano e que não será acrescido ao prêmio valores adicionais ao que se espera gastar com sinistros.

x	qx	px	lx
20	0,00062	0,99938	984341,5
21	0,00065	0,99935	983731,2
22	0,00067	0,99933	983091,8
23	0,00070	0,99930	982433,1
24	0,00073	0,99927	981745,4
25	0,00077	0,99923	981028,7
26	0,00081	0,99919	980273,3
27	0,00085	0,99915	979479,3
28	0,00090	0,99910	978646,8
29	0,00095	0,99905	977766
30	0,00100	0,99900	976837,1
31	0,00107	0,99893	975860,3
32	0,00114	0,99886	974816,1

Para $u = \{20,25\}$ temos:

$$10^5 A_{u:\overline{6}|^1} = 10^5 v^6 {}_6p_{20,25} = 10^5 v^6 {}_6p_{20} {}_6p_{25}$$

$$10^5 A_{u:\overline{6}|^1} = 10^5 v^6 \frac{l_{26}}{l_{20}} \frac{l_{31}}{l_{25}} \approx \$73921,63$$

Status vida conjunta (Seguro dotal Misto)

O seguro dotal misto garante que o benefício será pago caso o status falhe dentro do período de cobertura n , ou todos os indivíduos sobrevivam a esse período. Logo,

$$A_{u:\bar{n}|} = A_{u:\bar{n}|}^1 + A_{u^1:\bar{n}|}$$

em que $u = \{x, y\}$.

EXEMPLO 5: Um casal busca contratar um seguro em que se ocorrer a primeira morte durante os dois anos de cobertura, será pago ao sobrevivente um benefício de 1 u.m. ao final do ano da morte. Se ambos estiverem vivos ao final dos dois anos, será pago um benefício de 1 u.m. nessa data. Qual o valor do prêmio pago por eles? Considere $x = 20$, $y = 25$ e $i = 3\%$ ao ano e que não será acrescido ao prêmio valores adicionais ao que se espera gastar com sinistros.

x	qx	px	lx
20	0,00062	0,99938	984341,5
21	0,00065	0,99935	983731,2
22	0,00067	0,99933	983091,8
23	0,00070	0,99930	982433,1
24	0,00073	0,99927	981745,4
25	0,00077	0,99923	981028,7
26	0,00081	0,99919	980273,3
27	0,00085	0,99915	979479,3
28	0,00090	0,99910	978646,8
29	0,00095	0,99905	977766
30	0,00100	0,99900	976837,1
31	0,00107	0,99893	975860,3
32	0,00114	0,99886	974816,1

$$A_{u:\overline{2}|} = A_{u:\overline{2}|^1} + A_{u^1:\overline{2}|}$$

em que $u = \{20, 25\}$

EXEMPLO 5: Um casal busca contratar um seguro em que se ocorrer a primeira morte durante os dois anos de cobertura, será pago ao sobrevivente um benefício de 1 u.m. ao final do ano da morte. Se ambos estiverem vivos ao final dos dois anos, será pago um benefício de 1 u.m. nessa data. Qual o valor do prêmio pago por eles? Considere $x = 20$, $y = 25$ e $i = 3\%$ ao ano e que não será acrescido ao prêmio valores adicionais ao que se espera gastar com sinistros

x	qx	px	lx
20	0,00062	0,99938	984341,5
21	0,00065	0,99935	983731,2
22	0,00067	0,99933	983091,8
23	0,00070	0,99930	982433,1
24	0,00073	0,99927	981745,4
25	0,00077	0,99923	981028,7
26	0,00081	0,99919	980273,3
27	0,00085	0,99915	979479,3
28	0,00090	0,99910	978646,8
29	0,00095	0,99905	977766
30	0,00100	0,99900	976837,1
31	0,00107	0,99893	975860,3
32	0,00114	0,99886	974816,1

$$A_{u:\overline{2}|} = A_{u:\overline{2}|^1} + A_{u^1:\overline{2}|}$$

$$A_{u^1:\overline{2}|} = \sum_{t=0}^1 v^{t+1} ({}_t p_{20,25}) q_{20+t,25+t}$$

$$A_{u:\overline{2}|^1} = v^2 {}_2 p_{20,25}$$

Status vida conjunta (Seguros diferidos)

Seguro diferido vitalício

$${}_m|A_{x,y} = (v^m {}_m p_{x,y}) A_{x+m,y+m}$$

EXEMPLO 6: Calcule ${}_3|A_{101,104}$, para isso considere $i = 5\%$ ao ano e a tábua de vida AT-49 masculina.

Resp.:

$${}_3|A_{101,104} = \left({}^{\text{red}}A_{101,104:\overline{3}|^1} \right) {}^{\text{green}}A_{104,107}$$

$${}^{\text{red}}A_{101,104:\overline{3}|^1} = v^3 {}_3p_{101,104} = v^3 {}_3p_{101} \times {}_3p_{104}$$

$${}^{\text{green}}A_{104,107} = \sum_{t=0}^{\infty} v^{t+1} ({}_tp_{104})({}_tp_{107})(1 - p_{104+t} p_{107+t})$$

Status vida conjunta (Seguros diferidos)

Seguro diferido temporário

$${}_m|A_{u^1:\overline{n}|} = (v^m {}_mp_{x,y})A_{w^1:\overline{n}|}$$

em que $u = \{x, y\}$ e $w = \{x + m, y + m\}$.

EXEMPLO 7: Dois irmãos decidem contratar um seguro que garantirá um benefício de 1 *u.m.* em caso de ao menos uma morte dentro de um período de 2 anos, contudo esse seguro tem uma carência de 3 anos. Qual o valor do prêmio pago por eles? Considere $x = 17$, $y = 22$ e $i = 3\%$ ao ano e que não serão acrescidos ao prêmio valores adicionais ao que se espera gastar com sinistros.

Resp.:

$${}_3|A_{u^{1:\bar{2}}}| = (v^3 {}_3p_{17,22})A_{w^{1:\bar{2}}}|$$

$$u = \{17,22\} \text{ e } w = \{20,25\}.$$

$$v^3 {}_3p_{17,22} = v^3 {}_3p_{17} {}_3p_{22}$$

$$A_{w^{1:\bar{2}}}| = \sum_{t=0}^1 v^{t+1} ({}_tp_{20,25}) (q_{20+t,25+t})$$

- **Portal Halley** : <https://atuaria.github.io/portalhalley/>
- Bowers et al. **Actuarial Mathematics**, 2ª edição. SOA, 1997.
- D. C. M. Dickson, M. R. Hardy and H. R. Waters. **Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks**. Cambridge University Press, 2019.
- CORDEIRO FILHO, Antônio. **Cálculo Atuarial Aplicado: teoria e aplicações, exercícios resolvidos e propostos**. São Paulo: Atlas, 2009.
- FERREIRA, P. P. **Matemática Atuarial: Riscos de Pessoas**. Rio de Janeiro: ENS, 2019
- PIRES, M.D.; COSTA, L.H.; FERREIRA, L.; MARQUES, R. **Fundamentos da matemática atuarial: vida e pensões**. Curitiba :CRV, 2022.

